

Ranigast S-O-S medicīniska ierīce

Košļājamās tabletes

- MAZINA GASTROEZOFAGEĀLĀ ATVIĻŅA SIMPTOMUS (piemēram, grēmas un vēdersāpes)
- MAZINA HIPERACIDITĀTI
- AIZSARGĀ KUŅĢA GĻOTĀDU

1. Identifikācija, sastāvs un mērķis

Ranigast S-O-S ir paredzēts gastroezofageālā skābes atviļņa simptomu, piemēram, grēmu un vēdersāpju, mazināšanai.

Ranigast S-O-S dod iespēju kontrolēt kuņģa hiperaciditāti, novēršot dedzināšanas sajūtu, vēdersāpes un dispepsiju.

Ranigast S-O-S ir efektīvs neatkarīgi no problēmas pamatcēloņa. Turklāt to var lietot arī kā papildlīdzekli pacientiem ar gastrītu.

1.1 Darbības mehānisms

Ranigast S-O-S satur dažādas sinerģistiskas vielas, kas darbojas kuņģa vidē. Medicīniskās ierīces sastāvs - nātrija algināts, algīnskābe, nātrija bikarbonāts un kalcija karbonāts - nodrošina ātru iedarbību.

Algināti ir īpaši, no noteikta veida aļģēm iegūti polisaharīdi. Nokļūstot kuņģa skābajā vidē, šīs šķiedrvielas ļoti ātri izraisa gela veidošanos. Šis gels pārklāj un aizsargā kuņģa gļotādu.

Bikarbonāta un karbonāta kombinācija neitralizē kuņģa skābo vidi. Turklāt oglekļa dioksīda burbuļus, kas veidojas, reaģējot ar sālsskābi, saista algināta gels, pārveidojoties putās, kas noklāj kuņģa sulas virsmu un mazina atviļņa epizožu skaitu.

1.2 Sastāvdaļas

Katrā tabletē ir 200 mg nātrija algināta, 50 mg algīnskābes, 80 mg nātrija bikarbonāta, 140 mg kalcija karbonāta.

Palīgvielas

Mannīts, sukraloze, silīcija dioksīds, augu izcelsmes magnija stearāts, glicerīna behenāts, ingvera ekstrakts, ingvera ēteriskā eļļa, citrona un piparmētru aromātvielas.

2. Iepakojums

Vienā kastītē ir 12 vai 24 tabletes.

3. Devas un lietošanas veids

Pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma: ieteicams lietot 2 tabletes pēc galvenās maltītes, pēc tam var uzdzert nedaudz ūdens.

Bērniem (6-12 gadi): ieteicams lietot vienu tableti pēc galvenās maltītes, pēc tam var uzdzert nedaudz ūdens.

Šīs devas efektīvi mazina kuņģa hiperaciditāti un novērš gastroezofageālo atvilti. Nepārsniedz ieteikto devu.

4. Blakusparādības

Medicīniskās ierīces **Ranigast S-O-S** sastāvdaļas ir drošas, pilnīgi bioloģiski saderīgas un ar labu panesamību, kas pierādīts specifiskās pārbaudēs.

Lietojot terapeitiskā efekta sasniegšanai nepieciešamās devās, blakusparādības, par kurām tika ziņots, bija aizcietējums vai īslaicīga caureja.

Ja simptomi saglabājas, konsultējieties ar ārstu.

5. Mijiedarbība ar uztura bagātinātājiem un zālēm

Medicīniskās ierīces **Ranigast S-O-S** sastāvdaļu mijiedarbība ar uztura bagātinātājiem nav zināma. Taču parasti visi uztura bagātinātāji, to vidū vitamīni, uzturvielas, augu izcelsmes un homeopātiskie līdzekļi jālieto vismaz divas stundas pirms vai divas stundas pēc medicīniskās ierīces **Ranigast S-O-S** lietošanas.

5.1 Zāļu mijiedarbība

Fizikālo un ķīmisko īpašību dēļ **Ranigast S-O-S** var aizkavēt vai mazināt vienlaikus lietoto vielu un zāļu uzsūkšanos. Tādēļ konsultējieties ar ārstu, pirms sākat lietot tādu preparātu kā **Ranigast S-O-S**, īpaši tad, ja lietojat pretapaugļošanās tabletes.

Ranigast S-O-S lietošanai vienlaikus ar tādām zālēm kā omeprazols, cimetidīns vai cisapriīds, kontraindikāciju nav; taču šajos gadījumos ieteicams konsultēties ar ārstu.

6. Uzglabāšana

Uzglabāt **Ranigast S-O-S** sausā vietā un sargājot no tiešas siltuma vai gaismas iedarbības.

Nelietot, ja iepakojums ir bojāts.

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Uzglabāt ierīci līdz 25°C temperatūrā.

7. Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Šī medicīniskā ierīce pamatā ir paredzēta lietošanai pieaugušajiem no 18 gadu vecuma. Taču **Ranigast S-O-S** dažkārt var lietot bērniem no 6 gadu vecuma vai pusaudžiem, norādot, ka 6-12 gadus veciem bērniem deva ir jāsamazina uz pusi un preparāts jālieto atbilstoši ieteikumiem. Šaubu gadījumā konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecības vai krūts barošanas laikā preparātu ieteicams lietot tikai pēc konsultēšanās ar ārstu.

Nepārsniegt ieteikto devu, jo lielāka deva var izraisīt aizcietējumu vai īslaicīgu caureju.

Preparāts ir kontrindicēts hroniska aizcietējuma vai caurejas, nieru slimības vai hroniskas sirds mazspējas gadījumā.

Nelietojiet **Ranigast S-O-S** ilgāk par 30 dienām. Ja simptomi saglabājas, konsultējieties ar ārstu.

Ja pēc noteikta preparāta lietošanas laika simptomi nav nepārprotami mazinājušies, ieteicams konsultēties ar ārstu.

Katra tablete ir paredzēta tikai vienreizējai lietošanai. Tablete no blistera jāizņem tieši pirms lietošanas. Nelietojiet tableti tad, ja nepanesat preparāta sastāvdaļas vai Jums ir diagnosticēta paaugstināta jutība pret tām.

8. Derīguma termiņš

Nelietot pēc derīguma termiņa, kas norādīts uz iepakojuma.

Derīguma termiņš attiecas uz pareizi uzglabātu un nebojātu medicīniskās ierīces iepakojumu.

9. Iznīcināšana

Ar ierīci, kurai beidzies derīguma termiņš, jārīkojas saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

Nekādā gadījumā neizmetiet preparātu vai tā iepakojumu apkārtējā vidē.




SIIT srl

Via Ariosto 50/60

20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

ITĀLIJA



Izplatītājs:

Polpharma SA

Ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Polija

Pēdējo reizi pārskatīts 04.2017.